

## Conseils généraux

**Activité physique** : Elle est possible et souhaitable en fonction de vos possibilités. L'activité sportive, possible, est à discuter avec votre médecin traitant.

**Alimentation** : Sauf contre-indication ou régime particulier, elle doit être variée et équilibrée. Évitez les aliments trop chauds, trop froids ou irritants qui peuvent favoriser aphtes et mucite.

**Tabac** : Il peut favoriser la survenue des aphtes. Si vous souhaitez engager un sevrage tabagique parlez-en à votre médecin.

**Alcool** : Les boissons alcoolisées ne sont la plupart du temps pas interdites pendant l'intercure où elles doivent être consommées avec modération. Évitez leur consommation pendant la cure en particulier pendant les jours où vous êtes chez vous avec votre infuseur.

**Exposition solaire** : À éviter avec la plupart des protocoles en particulier ceux comportant du 5FU. Il n'y a pas de protection particulière à envisager dans les conditions habituelles d'exposition. En cas d'ensoleillement important: protection par le port de chapeaux et de vêtements « couvrant » et utilisation de crèmes protectrices.

**Conduite automobile** : L'acuité visuelle et la concentration peuvent être altérées par la chimiothérapie et les médicaments qui l'accompagnent (anxiolytiques, anti émétiques...) Évitez de conduire pendant la cure. Pendant l'intercure, d'autres médicaments, en particuliers certains antalgiques peuvent représenter une contre-indication à la conduite. Parlez-en à votre médecin.

**Fièvre** : Prenez votre température devant toute sensation de fièvre ou de froid inexplicable ou en cas de frissons et informez-en votre médecin.

**Chambre implantable** : Surveillez régulièrement la peau en regard de la chambre et informez l'équipe médicale en cas de rougeur et/ou de gonflement, de même qu'en cas de douleur.

**Vaccinations** : La plupart des vaccinations et rappels sont autorisés, voire recommandés pendant votre chimiothérapie. Cependant certaines sont formellement contre-indiquées. Questionnez votre médecin traitant.

**Grossesse** : Une contraception efficace doit impérativement être utilisée pendant toute la durée de votre chimiothérapie. Prévenez rapidement votre médecin en cas de survenue d'une grossesse.

**Interactions médicamenteuses** : Informez votre médecin traitant de votre protocole de chimiothérapie (par cette fiche et votre carnet de liaison) et inversement, informez l'équipe médicale de tout nouveau traitement mis en place par votre médecin traitant. Ne prenez pas, sans avis médical préalable, de médicaments disponibles librement et sans ordonnance.

Site internet : [ffcd.fr](http://ffcd.fr)



# VOTRE CHIMIOTHÉRAPIE



## VOTRE PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE SE NOMME FOLFIRI-VECTIBIX°

Il se déroule sur 48 heures

Il comporte l'administration de trois molécules de chimiothérapie

Et d'un anticorps monoclonal

Il est associé à des procédures contre les nausées et vomissements



**Rythme** : Une cure de 48 heures est administrée toutes les deux semaines : J1 = J15

**Surveillance** : examen clinique et prise de sang avant chaque cure

**Les effets secondaires** (ou indésirables) sont propres à chaque molécule. Ils sont également fonction de la dose, du rythme d'administration et des médicaments associés. Il existe par ailleurs une variabilité entre les individus de telle sorte qu'ils peuvent être très variés et qu'ils sont difficilement prévisibles pour un individu donné.

**Il existe de nombreuses solutions pour les prévenir ou les traiter** : Il est important que vous soyez informé des effets secondaires potentiels, des mesures de prévention et de la conduite à tenir en cas de survenue. Cette information vous permet de participer « activement » à votre prise en charge et d'accéder à une meilleure maîtrise de l'évènement. De même, il est essentiel d'informer précisément l'équipe médicale de tout ce qu'il vous arrive. Ainsi, il vous est recommandé de noter soigneusement l'apparition de tout symptôme inhabituel, éventuellement sur votre carnet de liaison.

**Les symptômes énumérés ci-dessous sont les plus communément rencontrés. Vous ne les aurez pas forcément voire pas du tout.** Cela ne signifie pas que le traitement est inefficace.

A l'inverse, vous pouvez ressentir des signes et symptômes non décrits ici, et qui parfois pourront être imputés au traitement : Dans tous les cas, **signalez tout ce qui est inhabituel au médecin lors de chaque nouvelle cure**

**Votre médecin traitant** est une personne clef dans votre parcours de soins. Il pourra vous soutenir, vous accompagner, vous soulager. Il vous connaît bien et réside généralement près de votre domicile, ce qui peut être très précieux dans certaines situations. Il connaît également notre équipe et aura la possibilité de nous contacter si nécessaire. Il sera régulièrement tenu informé de votre parcours de soins personnalisé et pourra participer à votre propre information.

Cette fiche d'information, rédigée par le comité de rédaction du site Internet de la FFCD est destinée à servir de support aux explications sur la toxicité des protocoles données par votre médecin. Elle peut contenir erreurs ou coquilles qui ne peuvent être imputées aux auteurs



## **Principaux EFFETS SECONDAIRES AIGUS**

**Diarrhée** : Elle survient le plus souvent entre le 5<sup>ème</sup> et le 10<sup>ème</sup> jour. Elle peut être très sévère et justifie la mise en route précoce du traitement prescrit en respectant scrupuleusement ses modalités. Reportez vous à la fiche d'information spécifique.

**Nausées-vomissements** : un traitement préventif vous a été administré pendant votre cure et prescrit pour les jours suivants. Evitez les aliments gras et lourds, les plats fortement odorants et l'alcool. Prévenez votre médecin en cas de nausées sévères et/ou persistantes ou de vomissement malgré le traitement

**Aphtes/mucite** : leur survenue est favorisée par la consommation d'aliments irritants (noix etc...) et par un mauvais état buccodentaire (bilan préalable chez le dentiste souhaitable). La réalisation de bains de bouche 4 à 6 fois par jour et l'utilisation d'une brosse à dent souple permettent de les prévenir dans une certaine mesure. Il est important de prévenir votre médecin en cas d'aphtes/mucite sévères, responsables de douleurs et retentissant sur votre capacité à vous alimenter.

**Syndrome mains-pieds** : caractérisé par une sensation d'engourdissement, de chaleur voire des douleurs de la paume des mains de la plante des pieds, associés à une modification de l'aspect de la peau qui devient rouge et peut peler. Des fissures peuvent apparaître. Une bonne hydratation de la peau permet de le prévenir dans une certaine mesure. Sa survenue peut conduire à réduire la dose du produit de chimiothérapie responsable.

**Syndrome cholinergique** : caractérisé par la survenue de crampes, de douleurs abdominales, d'une diarrhée, d'une hyper salivation, de troubles visuels sans gravité pendant la perfusion d'Irinotecan. Il justifie, en l'absence de contre indication, l'administration d'une injection sous cutanée d'atropine immédiatement. Sa répétition avant les cures suivantes permettra de prévenir la récurrence de ce syndrome.

**Cellules sanguines** : la baisse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes est possible et identifiée par la prise de sang prévue avant chaque nouvelle cure. Surveiller la survenue d'une pâleur, de fièvre ou de saignement des gencives ou du nez et informez en votre médecin traitant

**Fièvre** : la survenue d'une fièvre à n'importe quel moment de l'inter cure doit vous faire consulter votre médecin traitant pour un examen clinique, une numération formule sanguine et parfois une mise sous antibiotiques. Ne négligez jamais l'apparition d'une fièvre qui peut traduire une infection et une baisse du taux de globules blancs

**Allergie** : une réaction allergique, exceptionnelle mais parfois grave peut survenir surtout lors de la première cure. Pour cette raison, un traitement préventif et une surveillance particulière seront mis en œuvre à la cure n°1

**Douleur thoracique** : la survenue d'une douleur dans la poitrine lors de la perfusion de 5FU, très rare, doit faire arrêter immédiatement la perfusion et nécessite un avis médical en urgence

**Rhinite/ Conjonctivite** se traduisant respectivement par avec écoulement nasal, clair ou mêlé d'un peu de sang, et une rougeur et une sensation d'irritation des yeux avec larmoiements, elles justifient de soins locaux (gouttes nasales ; collyre).

**Perte d'appétit et troubles du goût sont possibles.** une feuille de conseils vous sera remise. L'avis d'un diététicien est également utile dans une telle situation. Des informations détaillées sont disponibles sur le site de la FFCD [http://www.ffcd.fr/pdf/documentation/patients/livret\\_conseils\\_alimentaires.pdf](http://www.ffcd.fr/pdf/documentation/patients/livret_conseils_alimentaires.pdf)

**Fatigue** : la fatigue est assez fréquente. Elle peut être liée au traitement et à la maladie

**Libido** : peut être altérée par la maladie, les traitements et les répercussions psychologiques. Parlez en à l'équipe médicale

## **Principaux EFFETS SECONDAIRES CUMULATIFS**

**Alopécie** : chute des cheveux, de la barbe et des poils. Elle est inconstante et d'intensité variable. Elle apparaît généralement entre la première et la troisième cure et tend à se majorer. Elle peut justifier le port d'une perruque (« prothèse capillaire ») dont la confection est prise en charge par l'assurance maladie. Dans tous les cas, il convient d'éviter l'emploi fréquent de shampoings agressifs

**Toxicité cutanée** : rougeurs, boutons comparables à l'acné sont fréquents avec l'Eribitux°. Ils peuvent être prévenus par certains traitements. Protégez votre peau du soleil. Utilisez des pommades émollientes qui vous seront prescrites

**Ongles** : des plaies et fissures peuvent apparaître autour des ongles des mains et des pieds. Signalez rapidement leur apparition. Evitez le port de chaussures trop serrées et de vous blesser les pieds. Une évaluation avant la mise en route du traitement par une pédicure ou un dermatologue est souhaitable